SWITCH A GUSELKUMAB EN PSORIASIS MODERADA-GRAVE GUIADO POR EL CUESTIONARIO PSSD MEDIANTE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA NAVETA-PHEMIUM

ESCRIVÁ SANCHO EUGENIA(1), MERCADAL ORFILA GABRIEL(2), BLASCO MASCARÓ IGNACIO(2), LIÑANA GRANELL CARLA(2), ROMERO DEL BARCO ROCÍO(2)
Hospital Mateu Orfila, Menorca
(1) Servicio de Dermatologia, (1) Servicio Farmacia Hospitalaria.

Objetivos. El objetivo del estudio fue investigar el valor de los resultados percibidos por los pacientes (PRO) para guiar el cambio de fármacos biológicos en pacientes con psoriasis de moderada a grave que acuden a una consulta de farmacia hospitalaria.

Métodos. A sugerencia de los farmacéuticos hospitalarios, 45 pacientes completaron el instrumento Diario de los signos y síntomas de la psoriasis durante 7 días (PSSD_7D por sus siglas en inglés), de forma telemática por medio de la plataforma NAVETA-Phemium . A los pacientes con una puntuación igual o superior a 20 se les remitió al Servicio de Dermatología para su evaluación y cambio de tratamiento a guselkumab. La puntuación del PSSD_7D se evaluó después de 1, 6 , 12 , 18 y 24 meses de tratamiento.

Resultados. Catorce pacientes tuvieron una puntuación del PSSD-7D igual o superior a 20; todos ellos fueron aceptados para cambiar a guselkumab a dosis estándar. La puntuación del PSSD_7D mejoró desde el primer mes de tratamiento. Después de 24 meses, la puntuación PSSD fue un 92,23 % inferior a la puntuación inicial

Pacientes , n	14
Edad (años), media ± DE	52 ± 14,1
Mujeres(%)	2(20)
Raza	10(100)
Blanca	10(100)
Oriental	0
Negra	0
IMC (kg/m2), Media ± DE	22,9 ± 5,5
Peso (Media +DE)	79,13+ 22,1
Duración de la psoriasis (años), media ± DE	8,8± 5,2
Puntuación PASI (0-72),	11,3 ± 4,6
Tratamientos previos	10(100)
Fármacos tópicos	10(100)
Fototerapia	0
Fármacos sistémicos convencionales	8(80)
Biológicos previos	
1	9(70)
2	3(20)
3	1(10)
Puntuación PSSD inicial [0-100], n	51,4 ± 21

Tabla 1. Datos demográficos, clínicos de las serie estudiada



Gráfico 1. Evolución PSSD(Psoriasis Sign and Simpotms Diary) de la serie estudiada

Conclusiones. El uso del PSSD , nos permite detectar los pacientes que no están correctamente controlados, de acuerdo con la evaluación del propio paciente, y ello redunda en una detección temprana, de cara a optimizar el tratamiento, en colaboración multidisciplinar Farmacia Hospitalaria- Dermatología.
En nuestra serie, el cambio a una nueva diana terapéutica, concretamente anti IL-23 (Guselkumab) obtuvo un resultado satisfactorio en el control de la psoriasis medido por PSSD, pasando de 51,4 puntos basales a 4 puntos de media a los 24 meses , sin ningún evento adverso relevante a 24 meses de evaluación.

7º CONGRESO DE PSORIASIS PRESENCIAL - VIRTUAL